

PERİODONTAL BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Sayın hasta / yasal temsilcisi,

Sağlık durumunuz /hastanızın sağlık durumu ile ilgili önerilen tıbbi, cerrahi, teşhis için gerekli işlemler ve alternatifleri, faydaları, zararları, riskleri hakkında bilgi sahibi olmak, tamamını, ya da bir kısmını kabul etmek, yapılacak işlemleri istediğiniz zamanda durdurmak hakkına sahipsiniz.

Tedaviye başlanmadan önce, kalp, şeker hastalığı, tansiyon ve benzeri sistemik hastalıkların, hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların ve diğer hastalıkların, kullanılan ilaçların, hekiminizle paylaşılması hem kendi güvenliğiniz için hem de hekiminizin tedavi yöntemine karar vermesi ve tedaviyi planlaması için önemlidir.

Bu belge, planlanan uygulamalara izin verip vermeme konusunda sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME;

Periodontal hastalıklar, dişetlerinizin ve dişlerinizin etrafındaki destek dokuların ilerleyici ve yıkıcı iltihabi hastalıklardır. Dişeti kenarı ve altındaki bakteri plağı ve diş taşına karşı vücut bağışıklık sisteminin oluşturduğu iltihabi yanıtla başlarlar, dişeti çekilmesi ve kemik kaybıyla sonuçlanabilirler. Tedavisi, hekiminiz tarafından etken mikroorganizma ve diş taşlarının mekanik olarak uzaklaştırılması ve gerekli görüldüğü takdirde antibiyotik uygulaması ile gerçekleştirilecektir.

Periodontal başlangıç tedavisi ile diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi işlemi yapılacağından geçici diş hassasiyeti ve dişlerde sızlama gelişebilir. Ancak bu durum hassasiyet giderici patlar ile cila yapılması, hassasiyet giderici macun kullanımı veya flor jeli uygulaması ile geri döner. Hiç bir şey yapılmasa dahi hassasiyetiniz ortadan kalkacak ya da azalacaktır. Diş yüzeyi temizliği genel sağlığınıza zarar vermez.

Periodontal başlangıç tedavisi ile dişler arasında bulunan diş taşları uzaklaştırılacağı için dişlerinizin arası açılmış gibi hissedebilirsiniz, dişlerinizde herhangi bir aşınma olmayacaktır. Diş taşları uzaklaştırıldıktan sonra kemik erimesi ve dişeti çekilmesi mevcut dişlerde kemik desteği zayıf olduğu için dişler sallanmaya başlayabilir. Her durumda, dişler sallansa ve kaybedilse dahi dişeti iltihabına ve kemik erimesine sebep olan diş taşları uzaklaştırılmalıdır. Diş taşlarının bırakılması demek patolojinin devam etmesi demektir. Temizlik yapılmasa ve bırakılsa dahi bir süre sonra yine dişler kaybedilecektir. Temizlik sonrası dişleriniz sallanmaya başlayabilir ve dişlerinizi kaybedebilirsiniz.

Kök yüzeyi düzleştirme işlemi öncesi lokal anestezi yani sınırlı uyuşturma yapılır. Lokal anestezi uygulaması, bölgede anatomik farklılıklar veya akut enfeksiyonlar olmadığı sürece başarılı bir uygulamadır.

Bu tedavi sırasında çeşitli antibiyotik ve analjeziklerin, antiseptiklerin kullanılması gerekebilir ve bu ilaçların alımı sırasında alkol kullanımının ilaç etkileşimine neden olmamak amacıyla yasaklanması ve dikkat gerektirici işlemlerin yapılmaması gerekebilir.

Kullanılan ilaçların yan etkileri olabilir. Herhangi bir ilaca karşı alerjik durumunuz varsa tedavi öncesi hekiminizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Kök yüzeyi düzleştirme işleminin genel sağlığınıza zararı yoktur. Ancak işlem çeşitli sistemik veya bölgesel faktörler nedeniyle başarısızlığa uğrayabilir, tekrarlanmak zorunda kalınabilir.

Periodontal başlangıç tedavisi sonrası cerrahi tedaviye geçilebilir. Yapılan tedavinin başarıya ulaşması için size düşen sorumluluklar da vardır. Yapılan tedavi sonrası hekiminizin anlattığı şekilde ağız bakımı yapmanız çok önemlidir. Etkisiz bir ağız bakımı, yapılan tedavinin başarısızlığına yol açabilir.

Tedavi sonrasında hekiminiz size belli zaman aralıklarıyla kontrol randevuları verecektir. Kontrol randevularınıza gelmeniz gerekmektedir.

Lokal Anestezi

Diş hekimliğinde kullanılan lokal anestezi sonucu oluşan his kaybı süresi kullanılan anestezi maddeye, anestezinin uygulandığı bölgeye ve kişinin anatomik yapısına göre, 1-4 saat arasında değişiklik göstermektedir. Anestezi sonucu facial paralizi (geçici yüz felci), amfizem (yüzde şişlik), hematoma (yüzde kızarma, morarma) gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu durumlar geçicidir ve endişe edilmesine gerek yoktur. Anestezi sonucunda ayrıca alerjik reaksiyon (anafilaktik şok) oluşabilmekte, bu durumda acil müdahale edilmesi gerekebilmektedir.

Bunun için hastanın herhangi bir maddeye alerji olup olmadığını (penisilin alerjisi vb.) tedaviye başlamadan önce veya hekim ilaç yazacağı zaman söylemesi gerekmektedir.

PERİODONTAL BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Beklenmedik gelişmeler doğrultusunda tedavi ve bakım planında ek tedavi gereksinimleri veya değişiklikler olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir işlem yapılmadan hasta/yasal temsilci bilgilendirilecektir.

Tıp ve Diş Hekimliği Biliminin ve eğitiminin gelişmesi amacıyla tedaviler esnasında hasta /yasal temsilciden izinli olarak ağız içi resim ve video görüntüleri alınabilir.

ONAM

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum.

Yapılacak uygulamanın amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. Tedavi yöntemlerine ilişkin her türlü soru sorabilme fırsatı verildi ve sorduğum sorulara beni tatmin edecek cevaplar aldım.

Kendi rızamla tedavime ait gerekli her türlü tıbbi müdahalenin yapılması ve gerekli ilaçları kullanmak üzere onay veriyorum.

Hastanın Protokol Numarası:

Hastanın;

Ad Soyad:

Tel:

Adres:.....

İmza:

veya Hastanın Yasal Temsilcisinin*

Ad Soyad/Yakınlık Derecesi:

Tel:

Adres:.....

İmza:

HEKİM

İsmi yazılı olan hasta /yasal temsilci sine tarafımdan teşhis, yapılacak işlem ve nedeni, faydaları, işlem sonrası bakım, beklenen riskler, işlemi için gerekli ise uygulanacak anestezi tipi, anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta /yasal temsilcisi, girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu imzalayarak onaylamıştır.

Hekim

Adı Soyadı :

İmza :

Tarih :

Saat :